

# EDH - Enuresis Diagnose Hilfe

<b>Enuresis nocturna</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Nässt Ihr Kind in der Nacht ein?		
Alter > oder = 5 Jahre		

<b>Warnzeichen</b>
Falls die Antwort auf auch nur eine einzige der folgenden Fragen „JA“ ist, liegt möglicherweise keine simple „monosymptomatische Enuresis“ vor und eine weiterführende Diagnostik ist unbedingt indiziert!

<b>Urologische Symptome*</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Harnverlust tagsüber?		
Miktionsfrequenz/Tag > 8x		
Miktionsfrequenz/Tag < 3x		
Imperativer Harndrang?		
Elterliches Drängen zur Miktion notwendig?		
Portionsweises Urinieren?		
Begleiterkrankungen der Nieren und/oder Harntrakt		
<b>Vorgeschichte*</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Harnwegsinfekte?		
Vorangegangene erfolglose Therapieversuche		
<b>Stuhlgang**</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Verstopfung?		
Stuhlspuren in der Unterwäsche?		
<b>Trinkverhalten***</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Trinkt das Kind abends/nachts übermäßig		
<b>Psychologie**</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Verhaltensauffälligkeiten oder andere psychologische Probleme evident (z.B. ADHS)?		

*	Hinweise auf dyskoordinierte Blasenentleerung
**	Risiko für Therapieversagen
***	Risiko für Nebenwirkungen bei medikamentöser Therapie